

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

Leia o texto para responder a esta questão.

Acesso à mamografia pelo SUS é drama para mulheres em MG

Burocracia no acesso e valores defasados no pagamento de procedimentos, insumos e profissionais, resultando em menor oferta de serviços, diagnósticos tardios, evasão e mortes. Esses foram os principais problemas relatados nesta terça-feira (16/7/24), em audiência pública sobre os entraves à realização de mamografias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.

O debate foi realizado pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

De um lado, **embora** reconheçam avanços, os secretários reforçaram a necessidade de mais agilidade e justiça no repasse de recursos do SUS. Do outro, o titular da SES garantiu que, **embora** o financiamento do setor seja no modelo tripartite (União, Estados e municípios), nos próximos três meses deve ser implementada uma nova estratégia de articulação do Executivo diretamente com as prefeituras, inclusive com a implementação de um aplicativo específico voltado para a saúde da mulher. (...)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. **Acesso à mamografia pelo SUS é drama para mulheres em MG**, 16 de julho de 2024. Adaptado de: <<https://www.almg.gov.br/comunicacao/noticias/arquivos/Acesso-a-mamografia-pelo-SUS-e-drama-para-mulheres-em-MG/>>. Acesso em: 24 set. 2024.

Da análise do texto, é adequado afirmar que os operadores discursivos sublinhados consistem, de acordo com Fávero (2007), em operadores de:

- comparação, pois designam uma conexão cujos conteúdos são comparados entre si.
- contrajunção, pois articulam sequencialmente frases cujos conteúdos se opõem.
- conjunção, pois designam um tipo de conexão cujos conteúdos se adicionam.
- conclusão, pois designam uma explicação de um ato anteriormente realizado.

QUESTÃO 02

Leia o texto para responder a esta questão.

Dia do Professor: (...) histórias de educadores que têm paixão pelo ofício

A profissão que forma todas as profissões: neste dia 15 de outubro, é comemorado no Brasil o Dia do Professor. Para celebrar a data, a International Schools Partnership reuniu (...) histórias inspiradoras de profissionais que têm verdadeira paixão pela Educação. (...)

Gillian: amor pelos pequenos

A sorocabana Gillian Taveira Moraes Ichiana, de 39 anos, está envolvida com a Educação desde pequena. Aos três anos, foi matriculada pela mãe no Centro de Educação Infantil Municipal de sua cidade natal, no interior de São Paulo. Ela afirma que, hoje, trabalhar com os pequenos alunos da Escola (...), na capital paulista, é uma forma de lembrar da infância, da qual se recorda com muito carinho.

“Até hoje me lembro das brincadeiras vividas no tanque de areia e no gira-gira. Lembro-me também da árvore com flores rosas, chamada popularmente de Pata-de-Vaca”, diz **a educadora**. O apreço pelo lúdico segue com Gillian, que sempre busca proporcionar experiências diferenciadas aos seus pequenos alunos.

A professora sempre estudou em escolas públicas, do infantil até o Ensino Médio. Ela, que tem algumas tias envolvidas na área da Educação, sempre teve apoio dos pais e da família em suas escolhas. (...)

Aos 17, Gillian formou-se em um curso de inglês que frequentou desde os 10. Em 2005, mudou-se com o marido Alexandre Toshio para o Japão. Lá estudou Pedagogia a distância pela Universidade Católica de Brasília. Em 2006, começou a dar aulas de inglês em uma escola brasileira em Hamamatsu, no estado de Shizuoka. Com a crise que afetou os imigrantes no Japão, ela e o marido retornaram ao Brasil em 2009. Em 2013, começou sua trajetória na Escola (...), como professora assistente.

Gillian não parou na faculdade: continuou se dedicando, fazendo cursos diversos sobre a Educação Infantil, como rotina, acolhimento, aprendizagens, inclusive participando como ouvinte de congressos sobre bilinguismo.

A educadora gosta de apreciar as horas vagas na presença de suas filhas, Alícia Aimi, de 14 anos, e Manuela Maki, de 8. As duas ainda não mostram inclinação para a área da Educação, mas Gillian afirma que as apoiaria incondicionalmente caso decidam enveredar na profissão. (...)

ABC do ABC. **Dia do Professor: três histórias de educadores que têm paixão pelo ofício**, 15 de outubro de 2024. Adaptado de: <<https://abcdoabc.com.br/dia-do-professor-tres-historias-de-educadores-que-tem-paixao-pelo-oficio/>> Acesso em: 15 out. 2024.

Da análise dos fragmentos sublinhados, o tipo de coesão que o texto apresenta é a

- a) segmental por paráfrase, pois emprega estruturas que reformulam o conteúdo de um texto-fonte.
- b) referencial por reiteração, pois o emissor emprega elementos que têm a mesma referência.
- c) sequencial por conexão, pois emprega operadores do tipo lógico que estabelecem relações entre duas proposições.
- d) recorrencial por paralelismo, pois emprega estruturas que são reutilizadas, mas com diferentes conteúdos.

QUESTÃO 03

Leia o texto para responder a esta questão.

As mulheres que 'pausam' tratamento do câncer de mama para engravidar

Um novo estudo aponta que paralisar a medicação utilizada contra o tumor por um período, para engravidar e amamentar, não traz prejuízos à saúde da mulher.

André Biernath - Da BBC News Brasil em Londres
05/10/2023 06:14 - atualizado 05/10/2023 07:55

(...)

O primeiro passo após o diagnóstico do câncer de mama costuma ser a cirurgia, que faz a retirada dos nódulos principais.

Mas há sempre o risco de sobrar algumas células tumorais microscópicas, impossíveis de ver a olho nu. Essas unidades podem se multiplicar e dar origem a novos caroços.

É para evitar esse cenário, e fazer uma espécie de "pente-fino", que os especialistas indicam as sessões de químico e/ou radioterapia.

Antes que essa segunda leva terapêutica comece, porém, é importante ter a conversa sobre maternidade e o eventual congelamento de óvulos (se a paciente tiver essa disponibilidade financeira): afinal, pode ser que as substâncias químicas e a radiação afetem as células reprodutoras.

Ao preservar os gametas femininos, é possível buscar uma fertilização *in vitro*, caso o procedimento seja necessário no futuro. (...)

Biernath, André. **As mulheres que 'pausam' tratamento do câncer de mama para engravidar**. Estado de Minas, 05 de outubro de 2024. Adaptado de: <https://www.em.com.br/app/noticia/saude-e-bem-viver/2023/10/05/interna_bem_viver,1571897/as-mulheres-que-pausam-tratamento-do-cancer-de-mama-para-engravidar.shtml#google_vignette> Acesso em: 15 out. 2024.

Da análise do texto, é adequado afirmar, somente em relação ao último parágrafo, que o fragmento “caso o procedimento seja necessário no futuro” tem sentido:

- a) Condicional, pois expressa uma condição necessária para que se realize o que se declara anteriormente.
- b) Concessivo, pois expressa que um obstáculo não impedirá ou modificará o que se declara anteriormente.
- c) Consecutivo, pois exprime efeito ou consequência do fato expresso anteriormente.
- d) Conclusivo, pois exprime intenção, objetivo e finalidade da declaração expressa anteriormente.

QUESTÃO 04

Leia o texto para responder a esta questão.

Faculdade nega emissão de diploma de técnica que assinou laudos de órgãos com HIV

Laboratório afirma que ela entregou diploma de biomedicina, mas a funcionária nega e diz ter sido usada como "laranja"

Redação Terra

15 out 2024- 12h40

(atualizado às 13h33)

A Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera afirmou, nesta terça-feira, 15, que não emitiu o certificado de biomedicina de Jacqueline Iris Bacellar de Assis, auxiliar administrativa que trabalhava no PCS Lab Saleme. De acordo com a Folha de S. Paulo, a assinatura da funcionária aparece em um dos laudos que atestam falso negativo para HIV dos órgãos de doadores que provocaram a infecção de 6 pacientes no Rio de Janeiro. (...)

De acordo com a Folha de S. Paulo, a defesa da funcionária disse que ela **"jamais trabalhou como biomédica"**, que **"não tem capacidade técnica e nunca teve interesse na função"**. A mulher, conforme seu advogado, também alegou que não reconhece o diploma citado pelo laboratório, pois **"jamais cursou ou tem a faculdade de biomedicina"**.

REDAÇÃO TERRA. **Faculdade nega emissão de diploma de técnica que assinou laudos de órgãos com HIV**, 15 de outubro de 2024. Adaptado de: <<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/faculdade-nega-emissao-de-diploma-de-tecnica-que-assinou-laudos-de-orgaos-com-hiv,ce03b741b807f668cd7e0e9a09b7dbf62p3j4lie.html>> Acesso em: 17 out. 2024.

Da análise do texto, é adequado afirmar que o uso das aspas no fragmento destacado consiste em:

- a) Retomada de expressões que o emissor julga inadequadas ao texto.
- b) Demarcação de que os termos entre aspas são neologismos.
- c) Ênfase de palavras ditas em outros contextos.
- d) Citação de palavras ditas por outras pessoas.

QUESTÃO 05

Leia o texto para responder a esta questão.

Audiência com a FarmaBrasil reforça importância da inovação para a indústria farmacêutica nacional

Ministra Luciana Santos recebeu os representantes da organização nesta segunda-feira (12) e afirmou que o Complexo Industrial de Saúde é uma das prioridades do Governo Federal

Publicado em 12/08/2024 19h32
Atualizado em 13/08/2024 14h54

(...)

De acordo com o presidente-executivo da FarmaBrasil, a indústria farmacêutica nacional está investindo forte em P&D desde 2011. “Nossas empresas estão absolutamente convergentes ao eixo 2 da missão da Nova Indústria Brasil (NIB)”, reforçou. O eixo 2 da NIB é relacionado à inovação, pesquisa e desenvolvimento. (...)

No plano da NIB são apresentados investimentos de R\$ 300 bilhões para financiamentos destinados à nova política industrial até 2026. “Essa política tem um impacto de várias naturezas, seja pela capacidade em dar respostas a nossa inteligência, a nossa capacidade, e aponta um desafio muito grande na área da saúde do nosso país”, falou Luciana Santos. (...)

BRASIL. Governo Federal. **Audiência com a FarmaBrasil reforça importância da inovação para a indústria farmacêutica nacional**, 12 de agosto de 2024. Adaptado de: <<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/08/audiencia-com-a-farmabrasil-reforca-importancia-da-inovacao-para-a-industria-farmaceutica-nacional>> Acesso em: 18 out. 2024.

Da análise do texto, em relação ao fragmento “seja pela capacidade em dar respostas **a** nossa inteligência, **a** nossa capacidade”, o uso de crase nos elementos destacados:

- a) não ocorre: os elementos destacados apenas exigem o uso da preposição como complemento nominal.
- b) é obrigatório: os elementos destacados precedem substantivos femininos ligados a pronomes demonstrativos.
- c) não ocorre: a regência verbal de “dar”, no fragmento, dispensa o uso da preposição.
- d) é facultativo: os elementos destacados precedem pronomes possessivos com substantivo feminino.

QUESTÃO 06

Leia o texto para responder a esta questão.

Cientistas revelam mecanismo cerebral relacionado à resiliência emocional

Camundongos que presenciam outros em adversidades lidam melhor com emoções negativas; relação entre habênula e menor vulnerabilidade ao trauma já tinha sido estudada por pesquisadores da USP

16/09/2024

Atualizado: 19/09/2024 às 18:29

Texto: Tabita Said

(...)

Para explorar os mecanismos cerebrais envolvidos com a aquisição da resiliência, os pesquisadores de Lausanne colocaram um camundongo “observador” próximo de outro submetido a pequenos choques elétricos nas patas. A exposição à experiência negativa do colega de gaiola protegeu os observadores de desenvolverem estados patológicos de depressão quando eles próprios foram expostos à mesma experiência desagradável.

O contrário, porém, não aconteceu: camundongos que não testemunharam experiências traumáticas de seus companheiros tiveram uma diminuição na liberação de serotonina para a habênula, o que os tornou incapazes de demonstrar resiliência.

SAID, Tabita. **Cientistas revelam mecanismo cerebral relacionado à resiliência emocional**. Jornal da USP, 16 de setembro de 2024. Adaptado de: <<https://jornal.usp.br/ciencias/cientistas-revelam-mecanismo-cerebral-relacionado-a-resiliencia-emocional/>> Acesso em: 18 out. 2024.

Da análise do texto, em relação ao último parágrafo, no fragmento “o que **os** tornou incapazes de demonstrar resiliência”, o elemento destacado corresponde a um complemento:

- a) indireto, retomando o sujeito da primeira oração.
- b) indireto, retomando o sujeito da oração anterior.
- c) direto, retomando o termo “camundongos”.
- d) direto, retomando o termo “companheiros”.

QUESTÃO 07

Leia o texto para responder a esta questão.

Estudo revela medicamento promissor no tratamento da dependência de drogas

Testada pela primeira vez contra abuso de substâncias, baixas doses de doxiciclina reduziram efeitos recompensadores da morfina e cocaína em animais

13/05/2024

Atualizado: 14/05/2024 às 16:50

Texto: Susanna Nazar

A doxiciclina, um antibiótico barato, amplamente utilizado desde a década de 1960 e com efeito neuroprotetor, mostra-se também promissora no tratamento de transtornos por uso de substâncias. É o que revelaram cientistas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP ao realizar testes com animais de laboratório.

Responsável pelo estudo, Amanda Juliana Sales, pesquisadora do Departamento de Farmacologia da FMRP, conta que tratou mais de 300 camundongos – em experimentos que avaliam o potencial de abuso da cocaína e da morfina – com subdoses da doxiciclina e, como resultado, verificou que as administrações reduziram os efeitos recompensadores das drogas de abuso em animais. Esta é a primeira vez que se observa a possível ação do medicamento contra a dependência química.

Mesmo que ainda não haja “nenhum estudo conduzido em humanos com transtornos por uso de substâncias investigando o efeito da doxiciclina”, informa Amanda, as evidências mostram que o medicamento é muito mais que um simples antibiótico e, pela segurança de baixas dosagens e dos resultados obtidos agora, poderia “ser redirecionado para o tratamento” desses transtornos. (...)

NAZAR, Susanna. **Estudo revela medicamento promissor no tratamento da dependência de drogas**. Jornal da USP, 13 de maio de 2024. Adaptado de: <<https://jornal.usp.br/ciencias/estudo-sugere-medicamento-promissor-no-tratamento-da-dependencia-de-drogas/>> Acesso em: 18 out. 2024.

Observando o contexto, o termo em destaque no texto provocará alteração de sentido se for substituído por:

- a) Embora.
- b) Posto que.
- c) Por mais que.
- d) A não ser que.

QUESTÃO 08

Leia o texto para responder a esta questão.

A democracia nas urnas e o interesse por pautas universais

A educação muda a forma como o eleitor vê o futuro, argumenta Renato Janine ao fechar sua série de comentários sobre democracia

Renato Janine Ribeiro
22/11/2023

No último programa falando de democracia, eu tive que parar no meio de um raciocínio que eu continuo agora; a questão que eu estava colocando era, de modo geral, que a democracia funciona quando as pessoas votam de acordo com seus próprios interesses – “interesse”, no caso, **tem** um sentido essencialmente econômico, toda a sociedade se divide entre pessoas mais pobres e pessoas mais ricas, pessoas mais ricas querem conservar o que **tem**, a renda, rendimento mensal, anual que elas têm e também as propriedades que acumularam, seja porque as adquiriram, seja porque ganharam por herança.

Então, o que nós temos aí é que a educação passa a ser um fator importante para a definição de pautas democráticas que não são apenas pautas de distribuição de renda, mas começam a ser pautas de valores, então, nós temos uma série de valores que vão emplacando, por exemplo, a defesa do meio ambiente, que atende interesses humanos, mas não especificamente os interesses dos mais pobres, embora os mais pobres sofram mais com a poluição do que os mais ricos, até pelo tipo de residência que **têm**. É uma pauta universal; a pauta da liberdade de orientação sexual também é uma pauta universal. Não há nenhuma regra pela qual os mais pobres **têm** uma incidência maior de homossexuais do que os mais ricos. Não existe nada disso. O que se vê são pautas universais que estão sendo emplacadas, em grande parte, graças à educação. Isso a gente vê nos Estados Unidos e começa a ver também na Europa.

RIBEIRO, R. J. **A democracia nas urnas e o interesse por pautas universais**. *Jornal da USP*, 22 de novembro de 2023. Adaptado de: <<https://jornal.usp.br/radio-usp/a-democracia-nas-urnas-e-o-interesse-por-pautas-universais/>> Acesso em: 21 out. 2024.

Observe os termos destacados no texto. Considerando a organização textual, em qual fragmento há inadequação quanto à concordância verbal?

- a) “querem conservar o que **tem**”.
- b) “até pelo tipo de residência que **têm**”.
- c) “**tem** um sentido essencialmente econômico”.
- d) “**têm** uma incidência maior de homossexuais”.

QUESTÃO 09

Considere o seguinte excerto para responder a esta questão.

[...] Mas no fundo **ambos** haviam parado no tempo das Guerras de Sucessão, ela com a artilharia na cabeça e ele com as árvores genealógicas; ela que sonhava para os filhotes um posto no exército, qualquer um, ele que, ao contrário, nos via casados com alguma grã-duquesa eleitora do Império... [...].

Adaptado de: CALVINO, I. *O barão nas árvores*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 9.

No fragmento apresentado, o termo “ambos” refere-se:

- a) a dois casamentos.
- b) à Guerra e à família.
- c) aos pais do narrador.
- d) aos filhotes da mulher.

QUESTÃO 10

O fragmento a seguir faz parte de uma reportagem.

“A educação positiva significa substituir o gritar, o bater, por uma atitude de educar de forma inteligente”, afirma. “O que está acontecendo é que isso está sendo confundido. A educação positiva não é uma educação **onde** a criança toma as próprias decisões da sua vida. Autoridade com afeto é o melhor caminho, segundo as evidências científicas”.

Adaptado de: <<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/2024/09/maes-apontam-frutos-negativos-da-educacao-positiva-e-especialistas-explicam-riscos.shtml>>. Acesso em: 24 set. 2024.

No fragmento, no que se refere à norma padrão, o uso do termo “onde”, como pronome relativo, está:

- a) Incorreto: não é possível recuperar o referente.
- b) Correto: o termo antecipa a referência a “caminho”.
- c) Incorreto: o termo se restringe à referência de lugar.
- d) Correto: é marca de oralidade aceita pela norma culta.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura. Júlia, que faz parte da Comissão de Ética, ao analisar uma conduta praticada por Alberto, também servidor público da instituição, sugeriu aplicação da pena de censura.

Qual conduta Alberto poderia ter praticado para incorrer na referida pena?

- a) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
- b) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- c) Realizar, dentro de prazos aceitáveis, qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- d) Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal.

QUESTÃO 12

Marta, servidora pública federal, deseja solicitar aquisição de produtos considerados comuns que serão utilizados nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade onde exerce suas atribuições. Ao consultar o setor de compras da instituição, Marta foi informada que os produtos solicitados seriam adquiridos por meio de licitação. Também foi solicitado que Marta elaborasse o estudo técnico preliminar.

Conforme dispõe a Lei nº 14.133/21, o estudo técnico preliminar conterá, entre outros, qual elemento?

- a) A justificativa para o parcelamento ou não da contratação.
- b) A autorização do dirigente máximo da instituição.
- c) A minuta do Termo de Referência.
- d) A modalidade de licitação.

QUESTÃO 13

José, servidor público federal estatutário, chefe do setor de patrimônio da instituição em que exerce sua função pública, deseja se candidatar a vereador municipal. Com dúvidas sobre o afastamento da licença para atividade política, questionou o departamento de gestão de pessoas sobre os possíveis efeitos de sua candidatura.

Ao analisar o requerimento de José, qual resposta, informada pelo departamento de gestão de pessoas, está em conformidade com a Lei nº 8.122/90?

- a) José terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Poderá ser afastado da função de chefia, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. Por fim, a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, José fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo até o término da licença.
- b) José terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Independentemente de sua função de chefia, será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. Por fim, a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, José fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, pelo período não superior a 2 (dois) meses.
- c) José terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. No entanto, não será afastado da função de chefia, após o registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Por fim, a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, José fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo.
- d) José terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Também será afastado da função de chefia, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. Por fim, a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, José fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses.

QUESTÃO 14

Em uma investigação policial foi constatado que Túlio, servidor público federal, recebia vantagem indevida em razão de sua função.

De acordo com o Decreto-Lei nº 2.848/40, a conduta praticada por Túlio é tipificada em qual crime?

- a) Corrupção passiva.
- b) Corrupção ativa.
- c) Prevaricação.
- d) Peculato.

QUESTÃO 15

De acordo com Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar boa-fé e princípios.

João solicitou ao órgão público informações a respeito de seus dados pessoais arquivados na repartição.

Pelo princípio do livre acesso aos dados, previsto na referida norma, João possui a garantia de:

- a) Informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial.
- b) Exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.
- c) Consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.
- d) Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Em atividades diárias, como o processamento de dados de análises clínicas ou a gestão de arquivos relacionados a diagnósticos, é essencial manter o sistema de arquivos e dados seguros e organizados no Windows. Um dos desafios é evitar que algum arquivo sensível seja acessado ou modificado sem a devida autorização.

Com base nas funcionalidades do MS-Windows, qual é o local adequado para configurar permissões específicas de leitura, gravação e execução em pastas que contêm dados críticos?

- a) Configurações de Permissão NTFS.
- b) Gerenciador de Tarefas.
- c) Firewall do Windows.
- d) Painel de Controle.

QUESTÃO 17

Ao redigir documentos como relatórios ou trabalhos acadêmicos, é comum a necessidade de organizar o conteúdo em seções que comecem em uma nova página, sem alterar a formatação do restante do texto.

No Microsoft Word, qual ferramenta permite iniciar, manualmente, uma nova página, mantendo a estrutura do documento inalterada?

- a) Espaçamento de Parágrafo.
- b) Inserção de Tabela.
- c) Quebra de Página.
- d) Margens.

QUESTÃO 18

O Google Chrome oferece o modo de navegação anônima, que protege a privacidade do usuário ao não armazenar certos tipos de dados.

Qual é o tipo de dado salvo pelo Chrome após o fim da sessão de navegação anônima?

- a) Cookies.
- b) Dados de sites.
- c) Histórico de navegação.
- d) Downloads feitos durante a sessão de navegação.

QUESTÃO 19

Você está utilizando uma planilha no MS Excel com 9 linhas de dados, da linha 2 até a linha 10. A Coluna A contém o status de cada aluno, indicando se ele concluiu ou não um curso com o valor "Concluído" ou "Não Concluído".

Qual fórmula deve ser utilizada para contar quantos alunos concluíram o curso, ou seja, quantas células na Coluna A contém o valor "Concluído"?

- a) =CONT.NUM(A2:A10)
- b) = SOMASE.VALORES(A2:A10)
- c) =SOMASE(A2:A10; "Concluído")
- d) =CONT.SE(A2:A10; "Concluído")

QUESTÃO 20

Um vírus de computador é um tipo de programa malicioso que pode infectar um sistema, causando danos ou comprometendo a segurança dos dados.

Qual ação é a mais eficaz para prevenir a infecção por vírus em um computador?

- a) Atualizar o sistema operacional e o software antivírus regularmente.
- b) Abrir anexos de e-mails de remetentes desconhecidos.
- c) Definir a opção de energia para alto desempenho.
- d) Instalar softwares de fontes desconhecidas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em relação ao risco obstétrico no pré-natal, é inadequado afirmar que:

- a) A organização dos processos de atenção durante o pré-natal, que inclui a estratificação de risco obstétrico, é um dos fatores determinantes para a redução da mortalidade materna, buscando com que cada gestante receba o cuidado necessário às suas demandas, por equipes com nível de especialização e de qualificação apropriados.
- b) A morte materna é definida como óbito de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
- c) A identificação das mulheres com maior risco obstétrico reduz a mortalidade materna e perinatal, sabendo que a maior parte dos óbitos maternos ocorre em mulheres com antecedentes de risco obstétrico prévios a esta gestação.
- d) O objetivo da estratificação de risco é prever quais mulheres têm maior probabilidade de apresentar eventos adversos à saúde, e a coordenação do cuidado pela Atenção Primária em Saúde (APS) permite ofertar o cuidado pré-natal, na unidade de origem, por meio de consultas médicas e de enfermagem e visitas domiciliares ainda que compartilhado com outras instâncias de saúde.

QUESTÃO 22

Em relação à avaliação da vitalidade fetal, é inadequado afirmar que:

- a) A sequência de alterações que levam ao comprometimento dos parâmetros do perfil biofísico fetal (diminuição da oxigenação fetal) são: cardiotocografia, movimentos corpóreos, movimentos respiratórios e tônus fetal.
- b) Dopplervelocimetria, cardiotocografia e perfil biofísico fetal não devem ser realizados para avaliação de vitalidade em gestação de baixo risco; eles se utilizam da predição do sofrimento fetal e não de sua confirmação.
- c) O fenômeno de centralização da circulação fetal não se relaciona com acidose ao nascimento, ao contrário do índice de pulsatilidade para as veias do ducto venoso.
- d) Na cardiotocografia, o estímulo sônico é utilizado para alterar o estado de sono para vigília, sendo, portanto, exame complementar à cardiotocografia de repouso suspeita de alteração.

QUESTÃO 23

Em relação à associação do leiomioma uterino, que é o tumor mais frequente do aparelho reprodutor feminino, e a gravidez, qual a afirmação é inadequada nessa situação?

- a) No terceiro trimestre, a avaliação do crescimento fetal é fundamental durante o pré-natal, principalmente nos casos de miomas retroplacentários que podem influenciar na nutrição fetal. Outra avaliação importante, mais próxima ao termo, é a decisão quanto à via de parto e à sua programação.
- b) A maioria dos leiomiomas possui crescimento volumétrico entre o primeiro e segundo trimestre da gravidez e no terceiro trimestre, há estabilização das suas características morfológicas, incluindo seu diâmetro médio.
- c) Uma das prioridades na avaliação dos miomas na gestação é investigar detalhadamente o sítio placentário, no fim do primeiro trimestre, com ênfase nas implantações próximas a leiomiomas submucosos na busca de acretismo placentário.
- d) É maior a incidência de cesárea nas gestantes com leiomiomatose uterina. A histerotomia preferencial é a segmentar transversa, distando, no mínimo, 2 cm de eventuais nódulos ístmicos. A abordagem cirúrgica dos leiomiomas durante o parto cesáreo é conduta de exceção.

QUESTÃO 24

Em relação às repercussões da gravidez no organismo materno, é inadequado afirmar que:

- a) O aumento do volume plasmático, em geral, é de 45 a 50% em comparação à mulher não gestante, ao passo que o número de células vermelhas se eleva em cerca de 30%, ocasionando uma situação de hemodiluição, que tem como uma das vantagens facilitar o trabalho cardíaco materno.
- b) O ganho ponderal na gestação decorre do acúmulo de componentes energéticos e estruturais maternos e em menor proporção do acúmulo de componente hídrico intra e extravascular.
- c) O aumento dos níveis séricos de prolactina tem por finalidade a preparação das glândulas mamárias que serão responsáveis pela produção de leite ao final da gestação.
- d) Todas as modificações gerais e locais desenvolvidas pelo organismo materno para adequação ao processo gestacional normal retornam às características pré-gestacionais até o final do puerpério, com exceção das mamas.

QUESTÃO 25

Em relação às anemias na gravidez, é inadequado afirmar que:

- a) A suplementação rotineira de ferro elementar na dose de 30-40mg/dia é recomendada como prevenção da anemia ferropriva para praticamente todas as gestantes (exceto pacientes com doenças caracterizadas por sobrecarga de ferro) e, para tratamento (níveis de hemoglobina entre 9,0 g/dL e 11,0 g/dL), o ferro, por via oral, é a primeira escolha na dose de 160 a 200 mg/dia de ferro elementar.
- b) A suplementação de ácido fólico (na dose de 0,4 a 0,8 mg/dia) deve ser iniciada, pelo menos, um mês antes da concepção para benefício da formação do tubo neural do embrião e deve ser mantida durante toda a gestação para prevenção de deficiência materna de folato e prevenção da anemia megaloblástica.
- c) Clinicamente consideramos anemia materna quando os níveis de hemoglobina são inferiores a 11,0 g/dL em qualquer idade gestacional. A anemia materna aumenta o risco de resultados adversos, como pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer, parto pré-termo, hemorragia pós-parto, maior mortalidade perinatal e materna.
- d) A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia afetando cerca de 40% das gestantes. A etiologia mais frequente dessa deficiência é a carência alimentar e perda crônica de sangue, como ocorre nas parasitoses intestinais e deficiências na absorção intestinal.

QUESTÃO 26

Em relação ao sangramento de primeira metade da gestação, é inadequado afirmar que:

- a) O principal local de ocorrência da prenhez ectópica é na porção ampular das tubas uterinas e os fatores de maior risco são: doença inflamatória pélvica, o uso de dispositivo intra-uterino, cirurgia tubária prévia, procedimentos relacionados à reprodução assistida e uso de anticoncepção de urgência.
- b) Nas formas clínicas de abortamento, encontraremos, na maioria das vezes, o orifício interno do colo fechado na ameaça de aborto, no aborto retido, na gestação anembrionada e no aborto completo.
- c) O abortamento representa a complicação mais frequente da primeira metade da gravidez: em torno de 15 a 60% de perda pós-fecundação, tendo como causa mais frequente as alterações cromossômicas.
- d) O diagnóstico diferencial entre as molas completa e parcial se baseia em critérios genéticos e clínicos, sendo que o prognóstico de evolução para neoplasia é maior na mola parcial.

QUESTÃO 27

Em relação à anatomia pélvica e suas correlações com o trabalho de parto e parto, é inadequado afirmar que:

- a) Os estreitos superior (com a *conjugata vera obstétrica*), médio (com o diâmetro bi-isquiático) e inferior (com a *conjugata exitus*) correspondem aos principais estreitos da bacia maior.
- b) Dentre os 4 tipos de bacia – ginecoide, antropoide, androide e platipeloide, a que tem pior prognóstico, à medida que o feto desce no canal de parto, é a androide.
- c) Na episiotomia médio lateral direita, os músculos perineais seccionados são fibras dos músculos transverso superficial do períneo e bulboesponjoso.
- d) Na porção superoposterior da cérvix, encontram-se os ligamentos úterossacros e na lateral dela os ligamentos cervicolaterais. Além de esses ligamentos fixarem o útero na porção mediana da pélvis, favorecem o processo de parturição e impedem que órgãos intra-abdominais desçam pelo hiato genital.

QUESTÃO 28

Em relação aos tumores anexiais, é inadequado afirmar que:

- a) A neoplasia de ovário engloba grande variedade histopatológica, cujo manejo depende do tipo específico do tumor. Os tumores epiteliais, o tipo mais comum, correspondem a cerca de 90% dos casos e correspondem ao cistoadenoma seroso, mucinoso e endometriode e Tumor de Brenner.
- b) Mulheres na pré-menopausa têm grande proporção de lesões benignas, com menor proporção de lesões malignas. Entre os principais diagnósticos benignos, estão os cistos funcionais ovarianos, endometrioma, teratomas maduros (cisto dermoide), corpo lúteo e abscesso tubo-ovariano.
- c) Os principais fatores de risco relacionados à neoplasia de ovário são: história familiar de neoplasia de mama ou ovário, presença de mutações dos genes BRCA1 e/ou BRCA2, neoplasia de cólon hereditária não polipoide (síndrome de Lynch).
- d) Segundo o American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), o rastreamento de câncer de ovário em mulheres assintomáticas deve ser feito com exame ginecológico e ultrassonografia transvaginal rotineiramente, pois tem acurácia significativa para tumores anexiais benignos ou malignos.

QUESTÃO 29

Em relação ao Sistema intrauterino liberador de lenonorgestrel SIU-LNG, é inadequado afirmar que:

- a) O SIU-LNG apresenta benefícios não contraceptivos como redução na duração e intensidade do sangramento uterino e melhora da dismenorreia primária, além da melhora da dor em mulheres com endometriose e adenomiose.
- b) As principais contraindicações ao SIU-LNG são câncer de colo uterino, endometrial, mioma subseroso ou alguma malformação uterina (septo, útero bicorno) com distorção da cavidade, estenose cervical, doença inflamatória pélvica e infecção puerperal. Também não deve ser utilizado em mulheres na vigência de câncer de mama.
- c) A utilização de métodos só com progestagênio, como é o caso do SIU-LNG, não aumenta o risco de doenças cardiovasculares e não altera o metabolismo lipídico.
- d) O principal efeito do sistema intrauterino (SIU-LNG) liberador de levonorgestrel é a ação local de atrofia endometrial, atuando também no muco cervical. O SIU-LNG tem pouco efeito sobre o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano, dessa forma a taxa de inibição de ovulação é inferior a 25%.

QUESTÃO 30

Em relação aos métodos contraceptivos, é inadequado afirmar que:

- a) Os implantes subdérmicos são considerados pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia (ACOG) método de primeira linha em adolescentes, já que são extremamente seguros e apresentam eficácia imediata se inseridos nos primeiros cinco dias do ciclo menstrual.
- b) Os anticoncepcionais combinados orais (ACO) são o método mais utilizado por adolescentes e o seu uso estendido não deve ser incentivado em decorrência de sangramentos intermenstruais frequentes que levam à maior falha contraceptiva do método.
- c) Os anticoncepcionais injetáveis combinados são categoria 1 da menarca até os 40 anos, segundo os critérios de elegibilidade da OMS, de 2015.
- d) Pode-se manter a contracepção em mulheres até os 55 anos, desde que não haja contraindicações ao método escolhido.

QUESTÃO 31

Em relação às mastites, é inadequado afirmar que:

- a) Enquanto na mastite aguda puerperal o diagnóstico é clínico e a ultrassonografia mamária pode ser útil quantificando a extensão da coleção purulenta, na mastite crônica não infecciosa os exames de imagem, a punção aspirativa e/ou biópsia são importantes para o diagnóstico e diagnóstico diferencial.
- b) O tratamento da mastite aguda puerperal consiste em: manter a amamentação; usar sutiã ou faixas para sustentar adequadamente as mamas; evitar ingurgitamento mamário; usar analgésicos, antitérmicos e antibióticos seguros durante a amamentação. Na presença de abscesso mamário, a drenagem cirúrgica é obrigatória.
- c) Mastites crônicas são caracterizadas por tempo de evolução maior que 30 dias ou pela recorrência após o tratamento e podem ou não ser precedidas por infecção aguda. Podem ser classificadas em infecciosas (quando existe um agente infeccioso identificado) e não infecciosas.
- d) Mastite aguda puerperal ocorre no período de amamentação, sendo mais comum da segunda à quinta semana do puerpério. Ocorre com maior frequência após parto vaginal e os germes mais relacionados à infecção são o *Staphylococcus aureus* e o *Staphylococcus epidermidis*.

QUESTÃO 32

Em relação aos pólipos genitais, é inadequado afirmar que:

- a) No tecido endometrial, o tamoxifeno age como antagonista estrogênico de baixa potência, desencadeando uma série de alterações como pólipos, hiperplasia e carcinoma endometrial.
- b) Como é frequente a associação do pólipo endocervical com o pólipo endometrial, orienta-se a investigação rotineira da cavidade uterina na presença de pólipo endocervical.
- c) Os pólipos cervicais são considerados as neoplasias benignas mais comuns do colo do útero e uma vez que a degeneração maligna do pólipo endocervical é extremamente rara, alguns autores consideram a remoção cirúrgica uma opção excessiva.
- d) A histeroscopia é o padrão-ouro no diagnóstico e tratamento do pólipo endometrial. A biópsia dirigida permite o estudo anatomopatológico da região mais alterada do pólipo, com alta sensibilidade e especificidade para lesões malignas.

QUESTÃO 33

Em relação ao rastreamento do câncer de mama, é inadequado afirmar que:

- a) De acordo com o Ministério da Saúde (MS) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA) não se recomenda o rastreamento mamográfico em pacientes com menos de 49 anos por evidências menores do benefício na redução da mortalidade. Na faixa etária entre 50 e 69 anos, recomenda-se a mamografia a cada dois anos, Após os 70 anos, não há recomendação para o rastreamento mamográfico.
- b) A ressonância magnética tem sua utilidade no rastreamento do câncer de mama principalmente em mulheres mais jovens e com mamas densas, pois apresenta alta especificidade na detecção precoce das lesões mamárias.
- c) O método de escolha para rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Embora a qualidade dos ensaios clínicos seja de qualidade moderada acerca da eficácia do rastreamento mamográfico na redução da mortalidade por câncer de mama, esse efeito na redução do risco absoluto é pequeno, ficando em torno de 0,05%.
- d) A mamografia deve ser realizada sempre em duas projeções, que rotineiramente deve incluir a craniocaudal e a oblíqua externa. A mamografia tem taxa global de falso-negativo que varia de 10% a 22%, elevando para 30% a 35% nas pacientes com mamas densas.

QUESTÃO 34

Em relação ao período puerperal, é inadequado afirmar que:

- a) Endometrite puerperal refere-se à infecção da decídua, e a cesariana é a causa mais frequente dessa patologia, principalmente, quando feita com a paciente em trabalho de parto.
- b) A exposição a antidepressivos maternos em lactentes é cinco vezes menor em comparação com a exposição uterina às mesmas medicações.
- c) A morbidade febril puerperal é definida com a presença de temperatura de, no mínimo, 38° C por 2 dias consecutivos, entre os primeiros 10 dias pós-parto, em pelo menos 4 tomadas diárias por via oral (excluídas as 24h iniciais).
- d) Fatores implicados no ingurgitamento mamário patológico são: início tardio da amamentação, mamadas com intervalos encurtados com restrição da duração, sucção ineficaz do RN e uso de complementos.

QUESTÃO 35

Em relação às úlceras genitais, é inadequado afirmar que:

- a) Em mais de 50% dos casos de úlcera vulvar, mesmo em serviços que dispõem de recursos laboratoriais, não se consegue fechar o diagnóstico etiológico. Dessa forma o tratamento empírico ou sintomático deve ser iniciado imediatamente, mesmo sem ter os resultados da investigação diagnóstica, considerando o diagnóstico mais provável, com base na apresentação clínica e nas circunstâncias epidemiológicas.
- b) Na sífilis recente, observa-se a presença de úlcera genital única, dolorida, com bordas endurecidas pelo processo inflamatório linfoplasmocitário e, se não tratada, involui espontaneamente. Ocorre também adenopatia satélite bilateral (inguinal), indolor e não inflamatória.
- c) Na investigação local da etiologia da úlcera, devem ser feitas as seguintes coletas: imprint da úlcera para pesquisa de células do herpes simples, raspar superficialmente a lesão com swab ou espátula de Ayre para pesquisa de *Haemophilus ducreyi* e limpar a úlcera e coletar linfa da base para investigação de *Treponema pallidum* em microscopia de campo escuro.
- d) O herpes genital é causa de úlcera genital com alta prevalência em nosso meio, e o tratamento na primo-infecção deve ser: Aciclovir 400 mg, três vezes ao dia (7 a 14 dias) ou Valaciclovir 1.000 mg, duas vezes ao dia (7 a 14 dias) ou Fanciclovir 250 mg, três vezes ao dia (7 a 14 dias).

QUESTÃO 36

Dentre as indicações para a realização da PAAF (Punção Aspirativa por Agulha Fina), há exceção de:

- a) Cistos simples volumosos.
- b) Nódulos palpáveis recém-diagnosticados em mulheres jovens, diante de ultrassonografia categoria 3, pelo sistema BI-RADS®.
- c) Linfonodos axilares, supra ou infraclaviculares, sem suspeição de malignidade ao exame físico ou aos métodos de imagem, porém com diâmetro aumentado.
- d) Hipótese diagnóstica de cisto com conteúdo espesso ao exame ultrassonográfico (imagens ovaladas, hipoecoicas, circunscritas e com reforço acústico posterior).

QUESTÃO 37

Sobre a mastalgia, é inadequado afirmar que:

- a) Dentre as causas de dor extramamária, estão: dor muscular, herpes-zóster, síndrome de Mondor, síndrome de Tietze, medicamentos, entre outras.
- b) A mastalgia cíclica não tem fisiopatologia totalmente conhecida, porém o entendimento é que pode estar relacionada com um desequilíbrio na relação estrogênio (E)/progesterona (P) no final da segunda fase do ciclo menstrual. Esse desequilíbrio atua em nível central, podendo levar a um aumento da sensibilidade do tecido mamário.
- c) A causa da dor mamária não é totalmente conhecida. O componente psicológico da mastalgia deve sempre ser considerado. Algumas situações de estresse podem favorecer o aparecimento do sintoma (por exemplo, o câncer de mama em pessoas próximas ou até a alta exposição da neoplasia mamária nos veículos de mídia). Porém, não se deve considerar a dor mamária como um problema apenas de ordem emocional.
- d) A mastalgia acíclica pode estar relacionada a diversas causas, a saber: hipertrofia mamária, macrocistos, nódulos de grande dimensão, cirurgia mamária prévia, ectasia ductal, mastites, trauma, medicamentos, entre outras.

QUESTÃO 38

Sobre o rastreamento do câncer de mama, é inadequado afirmar que:

- a) A prática ocasional da observação e da autopalpação das mamas, no contexto do conhecimento do próprio corpo, pode ser realizada de forma sistemática e com periodicidade fixa, mas não deve ser confundida com a aplicação do método como rastreamento padronizado.
- b) De acordo com Recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), o rastreio do câncer de mama em mulheres acima de 70 anos deve ocorrer de forma individualizada, para mulheres com expectativa maior que sete anos que possam ser submetidas a tratamento do câncer, considerando suas comorbidades.
- c) De acordo com o Ministério da Saúde (MS) e o INCA, publicado em 2015, na faixa etária entre 40 e 69 anos, recomenda-se a mamografia a cada dois anos, bianual. Após os 70 anos, não há recomendação para o rastreamento mamográfico.
- d) O exame clínico das mamas, realizado pelo profissional de saúde, demonstrou reduzir a mortalidade por câncer de mama, entre 50 e 60 anos, em virtude da lipossustituição adiposa, que aumenta a sensibilidade na palpação.

QUESTÃO 39

Em relação ao ciclo menstrual e sua fisiologia, é inadequado afirmar que:

- a) O LH tem papel na produção de substâncias proteolíticas e prostaglandinas. As primeiras serão responsáveis pela digestão da parede folicular, tornando-a mais fina e distensível. A segunda, a prostaglandina, agirá sobre as células de musculatura lisa que circundam o folículo, promovendo a contração delas e a ruptura do estigma ovulatório por conta da pressão sobre a superfície ovariana, liberando o óvulo.
- b) O ovário, em resposta à ação das gonadotrofinas, realiza basicamente dois processos: a esteroidogênese, ou produção de esteroides sexuais, e a foliculogênese, que é o recrutamento e o desenvolvimento dos folículos ovarianos.
- c) A produção de estradiol pela granulosa é proporcional ao número de células da granulosa que se prolifera no folículo, tendo impacto sistêmico em diferentes órgãos, inclusive o útero. Tal interação entre as células da teca e da granulosa para a produção de esteroides sexuais ovarianos é chamada de “mecanismo das duas células”.
- d) Cabe às células da granulosa produzir progesterona e androgênios, os quais entram nas células da teca por difusão e, por ação da enzima aromatase, se convertem em estradiol pela ação do LH.

QUESTÃO 40

Sobre o endométrio e o ciclo menstrual, é inadequado afirmar que:

- a) Após a ovulação, a progesterona passa a ser menos predominante, e o endométrio já sensibilizado pelo estrogênio acelera a atividade proliferativa e inicia a diferenciação das glândulas do epitélio pseudoestratificado, tornando-as mais tortuosas e promovendo o acúmulo de glicogênio e glicoproteínas no citoplasma dessas células, chamado endométrio proliferativo.
- b) O endométrio é composto de múltiplas camadas e pode ser dividido em duas porções distintas: a camada basal, responsável pelo processo de regeneração após a descamação menstrual, e a camada funcional, que se transforma de maneira mais ativa ao longo do ciclo e é descamada mensalmente na ausência de implantação embrionária.
- c) O início da fase folicular é marcado pela descamação menstrual de um endométrio preparado no ciclo precedente no qual a implantação não ocorreu, portanto o papel inicial do estradiol é o de cicatrizar o endométrio cruento após a descamação.
- d) Um ciclo ovulatório normal dura, em média, de 24 a 38 dias; a duração do corpo lúteo saudável é sempre fixa, de 12 a 14 dias; sendo assim, o que varia entre diferentes indivíduos é a fase folicular, que pode ser maior ou menor dependendo do tempo que o folículo leva para se desenvolver e ovular.

QUESTÃO 41

Em relação ao diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta, o quadro referido não ocorre na seguinte situação descrita:

- a) Quando, a partir da 20^a semana de gestação, ocorre o aparecimento ou piora da proteinúria já detectada na primeira metade da gestação.
- b) Na ocorrência de disfunção de órgãos-alvo.
- c) Quando gestantes portadoras de hipertensão arterial crônica necessitam de associação de anti-hipertensivos ou aumento das doses terapêuticas iniciais.
- d) Quando gestantes portadoras de hipertensão arterial crônica apresentam elevação de até 40 mmHG na Pressão Arterial Média após a 20^a semana de gestação.

QUESTÃO 42

Sobre o quadro de eclâmpsia, é adequado afirmar que:

- a) A maioria dos quadros de eclâmpsia ocorre antes do parto. No pós-parto, o risco maior é após a primeira semana.
- b) Gestantes que apresentam um quadro clínico típico de eclâmpsia, sem déficit neurológico persistente, não requerem avaliação subsidiária diagnóstica, além das necessárias para a pré-eclâmpsia. Casos atípicos merecem atenção de um neurologista e podem requerer tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética.
- c) A recuperação fetal intrauterina é bem menos eficaz do que o nascimento durante um período de crise convulsiva, quando mãe e feto estão em acidose. Portanto deve-se optar pela resolução da gestação, em geral num período de até, no máximo, quatro a seis horas, para que a gestante e o feto se recuperem do insulto convulsivo através da resolução da gestação.
- d) Uma atitude frequentemente adotada é a de indicar a resolução da gestação de maneira intempestiva, durante ou logo após uma convulsão, por cesariana e com anestesia geral.

QUESTÃO 43

Sobre o puerpério em situações de pré-eclâmpsia grave, é adequado afirmar que:

- a) Há o risco de evoluir com eclâmpsia e síndrome HELLP; a prescrição de sulfato de magnésio pode ser necessária; o tempo de uso deverá se embasar no contexto clínico, sendo frequentemente mantido por 24 horas.
- b) É possível que ocorra piora dos níveis pressóricos do primeiro ao terceiro dia após o parto, secundária à redistribuição líquida.
- c) Os hipotensores utilizados no anteparto devem ser sempre trocados por outras classes mais eficazes no controle da pressão arterial no período puerperal.
- d) O uso de anti-inflamatórios não esteroides no controle da dor não é contraindicado.

QUESTÃO 44

Em relação à avaliação da vitalidade fetal na paciente com diabetes mellitus gestacional (DMG), é inadequado afirmar que:

- a) Os desvios do crescimento fetal apresentam relação direta com a insulinemia fetal, resultante do excesso de glicose materna, que passa livremente ao feto pela placenta. No DMG, a alteração mais comum é o crescimento excessivo, tanto o grande para a idade gestacional (GIG), definido por peso ao nascer \geq Percentil 90, como o macrossômico, com peso ao nascer acima de 4.000 g.
- b) De modo geral, a avaliação por ultrassonografia (US) do crescimento fetal é iniciada entre 24 e 28 semanas, devendo ser individualizada na suspeita de alteração do crescimento fetal.
- c) O perfil biofísico fetal simplificado – cardiocografia sem estresse (de repouso) + avaliação do líquido amniótico – é o método mais comumente utilizado na avaliação da vitalidade fetal. A dopplervelocimetria da artéria umbilical tem indicação no DMG, devido ao risco de insuficiência placentária pelo insulto vascular placentário do DMG.
- d) A avaliação do bem-estar fetal é indicada no DMG tratado com insulina ou mal controlado, com início na 32^a semana associada à avaliação do crescimento fetal e da quantidade de líquido amniótico.

QUESTÃO 45

Em relação ao diagnóstico no diabetes mellitus gestacional, é inadequado afirmar que:

- a) Uma glicemia de duas horas pós 75 g de dextrosol ≥ 200 mg/dL, no teste oral de tolerância à glicose (TOTG-75g), é suficiente para o diagnóstico de diabetes prévio, diagnosticado na gestação.
- b) Uma glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL, solicitada após a primeira consulta pré-natal, é suficiente para o diagnóstico de diabetes mellitus, diagnosticado na gestação (diabetes prévio).
- c) Na impossibilidade de realização do teste oral de tolerância à glicose (TOTG-75g) no segundo trimestre, frente a recursos escassos, pode-se repetir a glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas, mantendo os mesmos valores de referência usados no 1º trimestre.
- d) Para pacientes com glicemia de jejum < 95 mg/dL no primeiro trimestre, deve-se realizar o teste oral de tolerância à glicose (TOTG-75g), entre 24 e 28 semanas, com avaliação da glicemia de jejum, 1 hora e 2 horas pós 75 g de dextrosol.

QUESTÃO 46

Sobre o rastreamento e diagnóstico da sífilis, é adequado afirmar que:

- a) A identificação do treponema pela pesquisa microscópica em campo escuro é o padrão-ouro do diagnóstico da doença em pacientes com doença sintomática tardia, especialmente na presença da fase latente.
- b) Apesar de os testes não treponêmicos serem baratos, de fácil execução e amplamente disponíveis, têm menor sensibilidade nas fases primária e terciária da doença, podem apresentar resultados falso-positivos (devido a infecções causadas por outras espécies de treponemas, doenças do colágeno, neoplasias, uso de drogas, de abuso e a própria gestação). Essa falsa positividade ocorre, entretanto, com títulos geralmente baixos ($\leq 1/4$) e deve ser considerada situação de exceção durante a gravidez.
- c) Como são titulados, os testes treponêmicos devem ser o padrão de seguimento após tratamento, buscando-se observar os títulos decaindo ou negatizando, especialmente se o tratamento foi realizado em fases iniciais da doença.
- d) De maneira geral, os testes não treponêmicos são mais sensíveis e específicos que os treponêmicos em todos os estágios da sífilis, e resultados falso-positivos são infrequentes. Os testes não treponêmicos confirmam o diagnóstico da doença.

QUESTÃO 47

São causas de oligoâmnio na gestação, com exceção de:

- a) Anomalias congênitas, especialmente relacionadas ao trato urinário.
- b) Restrição de crescimento fetal e insuficiência placentária.
- c) Rotura prematura de membranas.
- d) Medicações como hipotensores da classe iECA, betabloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio.

QUESTÃO 48

Dante de uma rotura prematura de membranas ovulares (RPMO) que ocorre entre 24 e 34 semanas, optando-se por conduta expectante, algumas medidas podem ser tomadas, com exceção de:

- a) Verificação do aspecto, do odor e da cor dos pensos de contenção vaginal.
- b) Hidratação via oral generosa (mínimo de 2,5 L ao dia).
- c) Tocólise profilática.
- d) Repouso relativo.

QUESTÃO 49

Em relação aos Anticoncepcionais Hormonais Combinados (AHC), é inadequado afirmar que:

- a) Agem inibindo a secreção de gonadotrofinas, sendo o progestagênio o principal responsável pelos efeitos contraceptivos observados. O principal efeito do progestagênio é a inibição do pico pré-ovulatório do hormônio luteinizante (LH), evitando, assim, a ovulação. Além disso, espessa o muco cervical, dificultando a ascensão dos espermatozoides.
- b) O componente estrogênico age inibindo o pico do hormônio folículo-estimulante (FSH) e, com isso, evita a seleção e o crescimento do folículo dominante. Além disso, ele age para estabilizar o endométrio e potencializar a ação do componente progestagênio, por meio do aumento dos receptores de progesterona intracelulares.
- c) Quanto mais androgênico o componente progestogênico da pílula combinada, menos trombogênico é o AHC.
- d) Os métodos orais combinados podem levar a ganho de massa adiposa e peso corpóreo no uso a longo prazo.

QUESTÃO 50

São contraindicações absolutas para o uso de Anticoncepcionais Hormonais Combinados (AHC), com exceção de:

- a) Trombofilia conhecida.
- b) Diabetes Mellitus sem doença vascular conhecida.
- c) Enxaqueca com aura independente da idade da paciente.
- d) Tabagismo em pacientes com mais de 35 anos (>15 cigarros/dia).